

Ларингит

Ларингит — это воспаление голосовых связок, вследствие которого возникают хрипота, кашель, боли в горле.

Надо знать!

- Ларингит редко длится дольше 48 часов.
- Чаще всего он развивается вследствие простуды.
- Если нет препятствия дыханию, ларингит не наносит значительно-го ущерба здоровью.

Симптомы болезни

- Увеличение температуры.
- Хрипота, потеря голоса.
- Сухой кашель.
- Боль в горле.

Что проверять

- Следите за температурой тела.
- Убедитесь, что нет симптомов крупа (резкого сужения голосовой щели).



Дифтерия

Дифтерия — это острое инфекционное заболевание, поражающее дыхательную систему, нервы, мышцы, сердце.

Надо знать!

- Прививка обеспечивает иммунитет.
- Привитый ребенок не заболеет на дифтерию, но может стать носителем ее возбудителя.
- Без лечения дифтерия может привести к смерти.
- Эту болезнь легко перепутать с ангиной, крупом.
- На дифтерию часто болеют не имеющие прививки взрослые.

Симптомы болезни



- Боль, белый налет в горле и на миндалинах.
- Увеличение и уплотнение шейных лимфатических узлов.
- Повышение температуры, головная боль, недомогание.
- Хрипота, кашель.
- Воспаление легких, паралич мышц, сердечная недостаточность (на позднем этапе).

Что проверять

- Все ли прививки были сделаны ребенку (до 1 года — 3 прививки с интервалом в 1 месяц; повторные прививки — в 1,5 года, 6, 14 и 18 лет, потом каждые 10 лет).

Обязательно обращайтесь к врачу, если:

- ваш ребенок не имеет прививки;
- вашему ребенку 2 месяца, и необходимо начать вакцинацию раньше времени;
- появился любой из симптомов, перечисленных выше.



Полиомиелит

Полиомиелит — это вирусная инфекция спинного мозга, которая приводит к параличу, а иногда и к смерти.

Надо знать!

- Полиомиелит легко предупредить с помощью вакцинации (до 1 года — 3 прививки, повторные прививки в 1,5 года, 6 и 14 лет).
- Предупредить инфекцию легче, чем лечить.
- У большинства детей начальная стадия заболевания протекает как простуда.
- Инкубационный период составляет 9—12 суток, иногда 3 недели.

Симптомы болезни

- Повышенная температура.
- Головная боль.
- Снижение аппетита.
- Рвота.
- Боль в мышцах.
- Паралич (на 3—7 сутки болезни).

Что проверять

- Были ли ребенку сделаны прививки.

